

## L'AQUILA REALE

*Aquila chrysaetos*

E' caratterizzata dalle grandi dimensioni e dall'abitudine al volo planato, con le ali disposte a V e le estremità sfrangiate ben visibili. I giovani hanno piumaggio scuro, due chiazze bianche sotto le ali, e una lunga fascia nera sotto la coda, che è anch'essa bianca. Questo piumaggio scompare dopo 4-5 anni. Ha una lunghezza di 90 cm, con un peso oscillante dai 3,7 ai 5,5 kg; l'apertura alare può raggiungere i 240 cm.

Frequenta i massicci montuosi o le regioni in cui esistono delle pareti rocciose a picco e delle gole incassate. Per nidificare di solito predilige pareti rocciose inaccessibili, eccezionalmente alberi. La coppia restaura di solito un vecchio nido ammassando rami secchi, che ricopre con ramoscelli di varia grandezza. La femmina depone, verso la fine di marzo/inizi aprile, 1-2 uova covate principalmente dalla femmina per 43-45 giorni. Il pulcino abbandona il nido verso l'80° giorno ma si trattiene con i genitori dei mesi o anche più. La prima riproduzione ha luogo a 4-5 anni.

Si nutre soprattutto di mammiferi, di uccelli e di rettili. Soprattutto durante la stagione invernale accetta ben volentieri le carcasse degli animali. Gli adulti, monogami, sono sedentari ancorati sempre al medesimo posto, mentre i giovani vagabondano alla ricerca di territori liberi su cui insediarsi.